

PREPORUKA VINOGRADARIMA

Autor Ivana Sardelić
Petak, 24 Svibanj 2019 13:44

Obavijest vinogradarima

Period intenzivnog porasta vinove loze pred cvatnju uz promjenjivo vrijeme praćeno čestim kišama pogoduje infekcijama najznačajnijih bolesti vinove loze. Pregledom podataka na agrometerološkim stanicama na području otoka Korčule uočeno je da su i dalje uvijeti za infekciju uzročnikom peronospore (*Plasmopara viticola*), pepelnice (*Uncinula necator*) i sive plijesni

(*Botrytis cinerea*

). Preporuka je obaviti zaštitu sistemčnim pripravcima: Alfil duplo, Mikal flash, Ridomil gold MZ, Forum star, Acrobat MZ, Mikal premium F, Curzate F, Fantic F, Pergado F.

Za zaštitu od pepelnice (*Erysiphe necator*) preventivno koristiti: Dynali, Crystal, Nativo, Talendo, Collis, Falcon, Topas, Luna, Stroby, uz dodatak topivog sumpora (Thiovit jet, Cosavet, Chromosul, Kossan).

Za zaštitu od uzročnika sive plijesni (*Botrytis cinerea*) preventivno koristiti jedan od pripravaka: Switch, Cantus, Pyrus, Teldor.

Porastom temperature očekuje se razvoj prve generacije sivog grožđanog moljca (*Lobesia botrana*) te u slučaju pojave koristiti: Reldan, Affirm, Laser, Decis, Fastac.

Tretiranja ponavljati svakih 7-10 dana ovisno o klimatskim uvjetima. Pripravke koristiti prema uputama proizvođača, a poslije tretiranja popuniti evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja. Praznu ambalažu zbrinuti na pravilan način.



MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
PODRUŽNICA KORČULA-LASTOVO

24.05.2019.

OBAVIJEST VINOGRADARIMA!

Period iztenzivnog porasta vinove loze pred cvatnju uz promjenjivo vrijeme praćeno čestim kišama pogoduje infekcijama najznačajnijih bolesti vinove loze. Pregledom podataka na agrometeorološkim stanicama na području otoka Korčule uočeno je da su i dalje uvjeti za infekciju uzročnikom **peronospore** (*Plasmopara viticola*).

pepelnice (*Uncinula necator*) i **sive plijesni** (*Botrytis cinerea*).

Preporuka je obaviti zaštitu sistemiznim pripravcima: **Alfil duplo**, **Mikal flash**, **Ridomil gold MZ**, **Forum star**, **Acrobat MZ**, **Mikal premium F**, **Curzate F**, **Fantic F**, **Pergado F**.

Za zaštitu od **pepelnice** (*Erysiphe necator*) preventivno koristiti: **Dynali**, **Crystal**, **Nativo**, **Talendo**, **Collis**, **Falcon**, **Topas**, **Luna**, **Stroby**, uz dodatak **topivog sumpora** (**Thiovit jet**, **Cosavet**, **Chromosul**, **Kossan**).

Za zaštitu od uzročnika **sive plijesni** (*Botrytis cinerea*) preventivno koristiti jedan od pripravaka: **Switch**, **Cantus**, **Pyrus**, **Teldor**.

Porastom temperature očekuje se razvoj prve generacije **sivog groždanog moljca** (*Lobesia botrana*) te u slučaju pojave koristiti: **Reldan**, **Affirm**, **Laser**, **Decis**, **Fastac**.

Tretiranja ponavljati svakih 7-10 dana ovisno o klimatskim uvjetima. Pripravke koristiti prema uputama proizvođača, a poslije tretiranja popuniti evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja. Praznu ambalažu zbrinuti na pravilan način.