



MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

DUBROVAČKO – NERETVANSKA ŽUPANIJA

PODRUŽNICA KORČULA- LASTOVO

8.07.2020.

OBAVIJEŠ MASLINARIMA!

Na opažačkim lokalitetima otoka Korčule zabilježen je let odraslih jedinki maslinine muhe (*Bactrocera oleae*) u visokom intenzitetu te je u narednim danima uputno provesti suzbijanje na osnovi:

fosmeta (**Imidan 50 WG**), dimetoata (**Rogor 40, Chromogor, Perfekthion, Calinogor** = iskoristiti zalihe jer je istekla registracija preparata) , deltametrina (**Decis 100 EC, Poleci plus, Rotor super, Scatto**). Pripravci na osnovi deltametrina imaju slabiji učinak pri povišenim temperaturama.

U ekološkoj proizvodnji koristiti jedan od proizvoda: **Asset, Neemazal, Kurstaki, Baturad WP ,Biobit WP** ili metodom zatrovanih mamaca. Mamci se pripremaju na način da se u 10 l vode doda 60 ml hidroliziranog proteina (Buminal) uz dodatak insekticida dozvoljenog za suzbijanje maslinine muhe. Tretira se jedna slabo rodna ili nerodna grana uz utrošak oko 2 dcl škropiva ili se pripremljeni mamaci punu u prikladne lovke (boce s otvorima). Tretiranje treba ponavljati svakih 10-12 dana te nadopunjavati ili mijenjati prema potrebi (u slučaju oborina i češće). Uz mamce može se također primijeniti **kaolin** koji stvara fizičku prepreku za polaganje jajašaca maslinine muhe.

Masline temeljito poprskati, najbolje predvečer, po mirnom vremenu, prema uputama proizvođača, a poslije tretiranja popuniti evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja. Praznu ambalažu zbrinuti na pravilan način.